Αγγείτις

Κορτικοστεροειδή

Prezolon amp. ενδομυϊκώς ή ενδοφλεβίως 25 mg τετράκις της ημέρας ή Solu-Medrol amp. 40 mg × 2 ημερησίως ή Medrol tabl. 16 mg × 4 ημερησίως εσωτερικώς.

Αν δεν υποχωρεί κυκλοφωσφαμίδη (Endoxan amp. ενδοφλεβίως 1 gr. ανά τ.μ. επιφανείας σώματος άπαξ του μηνός επί 6 μήνες ή Endoxan δισκία 50 mg × 2 ημερησίως επί διάστημα εξαρτώμενο από την προκαλουμένη λευκοπενία) ή ριτουξιμάβη, ιδίως επί υποτροπών (Mabthera ενδοφλεβίως 375 mg/Kg* κάθε εβδομάδα). Αντί της κυκλοφωσφαμίδης επί ηπιωτέρων περιπτώσεων αμεθοπτερίνη (Methotrexate δισκία 20–25 mg την εβδομάδα) ή επί βαρυτέρων μεθυλοπρεδνιζολόνη (Medrol 1 gr ημερησίως επί 3 ημέρες ενδοφλεβίως). Τοσιλιζουμάβη (Actemra 162 mg υποδορίως κάθε 1–2 εβδομάδες).

Αζαθειοπρίνη (Azathioprine δισκία, 50 mg τρίς της ημέρας) προστίθεται εις τα κορτικοστεροειδή όταν μειούται η δόση των.

Ομεπραζόλη (Losec δισκία 20 mg ημερησίως) προς προστασία του στομάχου ιδίως επί παρατεταμένης χρήσεως των κορτικοστεροειδών.

Ανεπιθύμητες ενέργειες

- Κορτικοστεροειδή επί παρατεινομένης χρήσεως: Υπεργλυχαιμία, η ευπάθεια προς λοιμώξεις, η οστεοπόρωση, η μυϊκή ατροφία, η άσηπτη νέκρωση των οστών, η αύξηση του βάρους, η αναστολή των γεννητικών ορμονών κ.λπ.
- Κυκλοφωσφαμίδης: Λευκοπενία. Αλωπεκία και νεοπλασίες της ουροδόχου κύστεως.
- Αμεθοπτερίνης και η αζαθειοπρίνης: Λευκοπενία.
- Ριτουξιμάβης: Αλλεργικές αντιδράσεις, λοιμώξεις κ.λπ.
- Τοσιλιζουμάβης: Λοιμώξεις, γαστρεντερικές διαταραχές.

Αγγείτις πνευμονική

Κορτικοστεροειδή και κυκλοφωσφαμίδη (βλέπε Αγγείτις). Τριμεθοπρίμη-σουλφισοξαζόλη (Septrintabl. 80–160 mg × 4) προς πρόληψη υποτροπών. Συμπτωματική αγωγή.

Ανεπιθύμητες ενέργειες

- Τριμεθοπρίμης -σουλφισοξαζόλης: Συχνές αλλεργικές αντιδράσεις, κυτταροπενία, ανουρία κ.ά.

Αγγειομυολίπωμα νεφρού

Χειρουργική εξαίρεση, αν η διάμετρός του υπερβαίνει τα 4 εκ. ή εμβολισμός, ιδίως επί αιμορραγίας.

Αγευσία

Αγωγή κατά της βλάβης που την προκαλεί (κεντρικό νευρικό σύστημα, γλωσσίτις).

Αγκυλοστομίαση

Παμοϊκό πυραντέλιο (Combantrin δισκία 250 mg × 4 εφ' άπαξ ή εναιώρημα 250 mg/κ.ε. × 4 εφ' άπαξ). Επί βαρειών περιπτώσεων συνέχιση επί 3 ημέρες. Αντ' αυτού μεβενδαζόλη (Vermox δισκία 100 mg × 2 × 3 ημέρες).

Ανεπιθύμητες ενέργειες

Των ανωτέρω: Γαστρεντερικές διαταραχές.

Αγκύλωση

Φυσιοθεραπευτική αγωγή εφόσον δεν υπάρχει ενεργός φλεγμονή.

Άγχος

Βουσπιρόνη (Bespar δισκία 10 mg × 1-2). Αντικαταθλιπτικά (βλέπε Ψύχωση). Γαβαπεντίνη (Neurontin δισκία 300 mg × 1-3). Επί πανικού αλπραζολάμη (Xanax δισκία 0.5-3 mg). Επί φοβικών καταστάσεων αντικαταθλιπτικά (βλ. Ψύχωση).

Ανεπιθύμητες ενέργειες

- Βουσπιρόνης: Ναυτία, κεφαλαλγία.

- Γαβαπεντίνης και αλπραζολάμης: υπνηλία, κόπωση κ.λπ.

Αδενίτις φυματιώδης

Βλέπε Φυματίωση.

Αδενοκαρκίνωμα εντέρου

Χειρουργική εξαίρεση. Επί σταδίου III και IV χημειοθεραπευτική αγωγή με 5-φθοριοουρακίλη (Fluoracil amp. 450 mg εβδομαδιαίως ενδοφλεβίως), οξαλιπλατίνη (85 mg/m^2 ενδοφλεβίως) και λεβαμιζόλη (150 mg ημερησίως × 3 ημέρες) ή ιντερφερόνη (Roferon εν. υποδορίως 2.000.000 M 3 φορές την εβδομάδα). Βεβασιζουμάβη προστίθεται. Αντί της φθοριοουρακίλης δίδεται το ανάλογό της καπεσιταβίνη (Xeloda δισκία 150 mg × 2 × 14 ημέρες, επαναλαμβανόμενα μετά μία εβδομάδα). Σχήματα με ιρινοτεκάνη (Campto), βεβασιζουμάβη (Avastin) ή σετουξιμάβη (Erbitux) ή πανιτουμομάβη (Vectibix) ή αφλιβερσέπτη ή ρεγοραφενίβη δοκιμάζονται. Ακτινοβόληση.

Ανεπιθύμητες ενέργειες

- Φθοριοουρακίλης: Γαστρεντερικές διαταραχές, καταστολή μυελού κ.λπ.
- Οξαλιπλατίνης: Καταβολή, γαστρεντερικές διαταραχές, καταστολή μυελού κ.λπ.
- Καπεσιταβίνης: Γαστρεντερικές διαταραχές, δυσαισθησίες.
- Ιρινοτεκάνης: Διάρροια, καταστολή μυελού.
- Βεβασιζουμάβης και Σιτουξιμάβης: Υπέρταση, διάρροια, διάτρηση γαστρεντερικού σωλήνα κ.λπ.

Αδενοκαρκίνωμα πνεύμονος

Όταν δεν υπάρχουν απομακρυσμένες μεταστάσεις λοβεκτομή. Επί σταδίου III προεγχειρητική χημειοθεραπευτική αγωγή με γεμσιταβίνη (Gemzarvial 1 gr/m^2 κάθε βδομάδα ενδοφλεβίως), πλατινόλη (Cisplatin 75 mg /m^2 κάθε 3 εβδομάδες) και δοσεταξέλη (Taxotere 80 mg/m^2 κάθε 3 εβδομάδες ή πεμετρεξέδη (Alimta 500 mg/m^2 κάθε 20 ημέρες). Βλέπε και Καρκίνος πνεύμονος, μη μικροκυτταρικός.

Ανεπιθύμητες ενέργειες

- Γεμσιταβίνης: Θρομβοπενία, έμετοι, ηπατική βλάβη κ.ά.
- Πλατινόλης: Έμετοι, υποπλασία μυελού, ηπατική βλάβη κ.ά.
- Δοσεταξέλης: Μυελική υποπλασία, έμετοι, ηπατική βλάβη κ.ά
- Πεμετρεξέδης: Γαστρεντερικές διαταραχές και αλλεργικές εκδηλώσεις.

Αδένωμα βρογχικό

Λοβεκτομή.

Αδένωμα επινεφριδίων

Βλέπε Φαιοχρωμοκύττωμα.

Αδένωμα ήπατος

Εκτομή όταν η διάμετρος του είναι άνω των 5 εκ.

Αδένωμα θυρεοειδούς τοξικό

Χειρουργική εκτομή. Επί ηλικιωμένων ραδιενεργό ιώδιο (20-30 mCi). Επί καλοήθους και επί αντενδείξεων χειρουργικής αγωγής βλέπε Θυρεοτοξίκωση.

Αδένωμα προστάτου

Επί συμπτωματικού χειρουργική εκτομή, διουρηθρική όταν το βάρος του είναι κάτω των 100 gr. Εμβολισμός αρτηρίας προστάτη. Διουρηθρική ένεση ατμού ύδατος. Εις αρχικά στάδια ή επί αντενδείξεως της επεμβάσεως α-αναστολείς όπως τεραζοσίνη (Hytrin δισκία 1-5 mg ημερησίως) ή ταμσουλοσίνη (Omnic καψ. 0.4 mg) ή φιναστερίδη, αντιανδρογόνο (Proscar δισκία 5 mg ημερησίως).

Ανεπιθύμητες ενέργειες

- α-αναστολέων: Υπόταση.
- Φιναστερίδης: Μείωση ικανότητος.

Αδένωμα υποφύσεως χρωμόφοβο

Χειρουργική εκτομή ή ακτινοβόληση (βελόνες υτρίου, δέσμη πρωτονίων)

Αδένωμα υποφύσεως ηωσινόφιλο ή μεικτό

Χειρουργική εκτομή διασφηνοειδής επί ταχέως εξελισσομένων και επί ατόμων κάτω των 40 ετών. Επί αναποτελεσματικής επεμβάσεως ή προς διατήρηση γονιμότητος ακτινοβόληση διά γραμμικού επιταχυντού ή γ-μαχαιριδίου. Επί ατόμων μεγάλης ηλικίας βρωμοκρυπτίνη (Parlodel δισκία 10 mg × 2 ημερησίως) ή καβεργολίνη (Dostinex δισκία 0.5 mg). Οκτρεοτίδη (Sandostatin 30 mg ενδομυικώς/μήνα) ή λανρεοτίδη (Somatulin 90 mg ενδομυικώς/μήνα), ή πεβγισομάντη (Somavert 10 mg ημέρα, ενδομυικώς, αυξανόμενα κάθε μήνα μέχρι 40 mg) επί μακρόν.

Ανεπιθύμητες ενέργειες

- Βρωμοκρυπτίνης και καβεργολίνης: Υπέρταση, έλκος, σύνδρομο Raynaud κ.ά.
- Οκτρεοτίδης και λανρεοτίδης: Διάρροια, χολολιθίαση.
- Πεβγισομάντης: Υπέρταση, ηπατική βλαβη.

Αδυναμία μυϊκή

Μυική άσκηση. Καταπολέμηση αιτίου.

Αεροφαγία

Σιμεθικόνη και αντιόξινα (Simeco ή Maaloxplus εναιώρημα 5–15 εκ. τρις-τετράκις ημερησίως). Αντιχολινεργικά (Βλέπε Άλγη σπαστικά). Διόρθωση ανωμαλιών καταπόσεως. Σωματική άσκηση.

Ανεπιθύμητες ενέργειες

- Σιμεθικόνης, αντιοξίνων: Ασήμαντες διά συνήθεις δόσεις και βραχεία διάρκεια λήψεως.
- Αντιχολινεργικών: Ταχυκαρδία, αύξηση ενδοφθάλμιας πίεσης, δυσουρία.