

Αγγείτις

Κορτικοστεροειδή

Prezolon amp. ενδομυϊκώς ή ενδοφλεβίως 25 mg τετράκις της ημέρας ή Solu-Medrol amp. 40 mg x 2 ημερησίως ή Medrol tabl. 16mg 4 ημερησίως εσωτερικώς.

Αν δεν υποχωρεί κυκλοφωσφαμίδη (Endoxan amp. ενδοφλεβίως 1gr. ανά t.m. επιφανείας σώματος άπαξ του μηνός επί 6 μήνες ή Endoxan tabl. 50 mg x 2 ημερησίως επί διάστημα εξαρτώμενο από την προκαλουμένη λευκοπενία). Αντί της κυκλοφωσφαμίδης επί ηπιωτέρων περιπτώσεων αμεθοπτερίνη (Methotrexate tabl 20-25 mg την εβδομάδα) ή επί βαρυτέρων μεθυλοπρεδνιζόλον (Medrol 1 gr ημερησίως επί 3 ημέρες ενδοφλεβίως).

Αζαθειοπρίνη (Azathioprine tabl, 50 mg τρίς της ημέρας) προστίθεται εις τα κορτικοστεροειδή όταν μειούται η δόση των.

Ομεπραζόλη (Losec tabl. 20 mg ημερησίως) προς προστασία του στομάχου ιδίως επί παρατεταμένης χρήσεως των κορτικοστεροειδών.

Κύριες ανεπιθύμητες ενέργειες των κορτικοστεροειδών επί παρατεινομένης χρήσεως είναι η υπεργλυκαιμία, η ευπάθεια προς λοιμώξεις, η οστεοπόρωση, η μυϊκή ατροφία, η άσηπη νέκρωση των οστών, η αύξηση του βάρους, η αναστολή των γεννητικών ορμονών κ.λπ.

Κύρια ανεπιθύμητη ενέργεια της κυκλοφωσφαμίδης είναι η λευκοπενία. Άλωπεκία και νεοπλασίες της ουροδόχου κύστεως παρατηρούνται. Η αμεθοπτερίνη και η αζαθειοπρίνη προκαλούν λευκοπενία.

Αγγείτις πνευμονική

Κορτικοστεροειδή και κυκλοφωσφαμίδη (βλέπε Αγγείτις)

Τριψεθοπρίμη-σουλφισοξαζόλη (Septin tabl. 80-160mg x 4) προς πρόληψη υποτροπών. Συμπτωματική αγωγή.

Ανεπιθύμητες ενέργειες της τριψεθοπρίμης –σουλφισοξαζόλης συχνές αλλεργικές αντιδράσεις, κυτταροπενία, ανουρία κ.ά.

Αγγειομυολίπωμα νεφρού

Χειρουργική εξαίρεση, αν η διαμετρός του υπερβαίνει τα 4 εκ. ή εμβολισμός

Αγευσία

Αγωγή κατά προκαλούστης βλάβης (κεντρικό νευρικό σύστημα, γλωσσίτις).

Αγκυλοστομίαση

Παμοϊκό πυραντέλιο (Combantrin tabl. 250 mg X 4 εφ' άπαξ ή εναιώρημα 250mg/κ.ε. X 4 εφ' άπαξ) . Επί βαρειών περιπτώσεων συνέχιση επί 3 ημέρες. Αντ' αυτού μεβενδαζόλη (Vermox tabl. 100 mg X 2 X 3 ημέρες).

Ανεπιθύμητες ενέργειες των ανωτέρω γαστρεντερικές διαταραχές.

Αγκύλωση

Φυσιοθεραπευτική αγωγή εφ' όσον δεν υπάρχει ενεργός φλεγμονή.

Αδενίτις φυματιώδης

Βλέπε Φυματίωση

Αδενοκαρκίνωμα εντέρου

Χειρουργική εξαίρεση. Επί σταδίου III και IV χημειθεραπευτική αγωγή με 5-φθοριοουρακιλή (Fluoracil amp. 450 mg εβδομαδιαίως ενδοφλεβίως), οξαλιπλατίνη (85 mg/m² ενδοφλεβίως) και λεβαμιζόλη (150 mg ημερησίως X 3 ημέρες) ή ιντερφερόνη (Roferon inj. υποδορίως 2.000.000 M 3 φορές την εβδομάδα). Αντί της φθοριοουρακιλής δίδεται το ανάλογο της καπεσιταβίνη (Xeloda tabl. 150 mg x 2 x 14 ημέρες επαναλαμβανόμενα μετά μία εβδομάδα) Σχήματα με ιρινοτεκάνη (Campto), βεβασιζουμάβη (Avastin) ή σετούξιμάβη (Erbitux) δοκιμάζονται.

Ακτινοβόληση

Ανεπιθύμητες ενέργειες

Φθοριουρακύλης γαστρεντερικές διαταραχές, καταστολή μυελού κλπ., οξαλιπλατίνης: καταβολή, γαστρεντερικές διαταραχές, καταστολή μυελού κ.λπ. Καπεσιταβίνης γαστρεντερικές διαταραχές, δυσαισθησίες. Ιρινοτεκάνης διάρροια, καταστολή μυελού.

Βεβασιζουμάβης και Σιτουξιμάβης υπέρταση, διάρροια, διάτρηση γαστρεντερικού σωλήνα κ.λπ.

Αδενοκαρκίνωμα πνεύμονος

Όταν δεν υπάρχουν απομακρυσμένες μεταστάσεις λοβεκτομή. Επί σταδίου III προεγχειρητική χημειοθεραπευτική αγωγή με γεμσιταβίνη (Gemzar vial 1gr /m2 κάθε βδομάδα ενδοφλεβίως), πλατινόλη (Cisplatin 75 mg /m2 κάθε 3 εβδομάδες) και δοσεταξέλη (Taxotere 80 mg/m2 κάθε 3 εβδομάδες).

Ανεπιθύμητες ενέργειες

Γεμσιταβίνης θρομβοπενία, έμετοι, ηπατική βλάβη κ.ά. Πλατινόλης έμετοι, υποπλασία μυελού, ηπατική βλάβη κ.ά. Δοσεταξέλης: μυελική υποπλασία, έμετοι, ηπατική βλάβη κ.ά

Αδένωμα βρογχικό

Λοβεκτομή.

Αδένωμα επινεφριδίων

Βλέπε Φαιοχρωμοκύττωμα.

Αδένωμα θυρεοειδούς τοξικό

Χειρουργική εκτομή. Επί ηλικιωμένων ραδιενεργό ιώδιο (20-30 mCi)

Αδένωμα προστάτου

Επί συμπτωματικού χειρουργική εκτομή, διουρηθρική όταν το βάρος του είναι κάτω των 100 γρ. Εις αρχικά στάδια ή επί αντενδείξεως της επεμβάσεως α-αναστολείς όπως τεραζοσίνη (Hytrin tabl. 1-5 mg ημερησίως) ή ταμσουλοσίνη (Omnic caps. 0.4 mg) ή φιναστερίδη, αντιανδρογόνο (Proscar tabl. 5 mg ημερησίως).

Ανεπιθύμητες ενέργειες των α-αναστολέων: υπόταση, της φιναστερίδης: μείωση ικανότητος.

Αδένωμα υποφύσεως χρωμόφοβο

Χειρουργική εκτομή ή ακτινοβόληση (βελόνες υτρίου, δέσμη πρωτονίων)

Αδένωμα υποφύσεως εωσινόφιλο ή μεικτό

Χειρουργική εκτομή διασφηνοειδής επί ταχέως εξελισσομένων και επί ατόμων κάτω των 40 ετών. Επί αναποτελεσματικής επεμβάσεως ή προς διατήρηση γονιφτότης ακτινοβόληση διά γραμμικού επιταχυντού ή γ-μαχαιρίδου. Επί ατόμων μεγάλης ηλικίας βρωμοκρυπτίνη (Parlodel tabl. 10 mg x 2 ημερησίως) ή καβεργολίνη (Dostinex tabl. 0.5 mg).

Ανεπιθύμητες ενέργειες της βρωμοκρυπτίνης και της καβεργολίνης: υπέρταση, έλκος, σύνδρομο Raynaud κ.ά.

Αδυναμία μυϊκή

Μυϊκή άσκηση. Καταπολέμηση αιτίου.

Αεροφαγία

Σιμεθικόνη και αντιόξινα (Simeco ή Maalox εναιώρημα 5-15 εκ. τρις-τετράκις ημερησίως). Αντιχολινεργικά (Βλέπε Άλγη σπαστικά). Διόρθωση ανωμαλιών καταπόσεως. Σωματική άσκηση.

Ανεπιθύμητες ενέργειες

Ασήμαντες διά συνήθεις δόσεις

Αθέτωση

Μυοχαλαρωτικά (βλέπε Ισχυαλγία), ηρεμιστικά (βλέπε Άγχος) και λ-δόπα (βλέπε Νόσος του Parkinson).

Αιμαγγειοβλάστωμα

Χειρουργική αγωγή και ακτινοβόληση.

Αιμαγγειοενδοθηλίωμα

Χειρουργική αγωγή και ακτινοβόληση

Αιμαγγείωμα εντέρου

Χειρουργική αγωγή επί συμπτωματικών.

Αιμαγγείωμα ήπατος

Χειρουργική αγωγή επί πιεστικών φαινομένων (άλγη ή υπόνοια νεοπλασίας).

Αίμαρθρος

Κορτικοστεροειδή (βλέπε Αγγείτις), εκτομή θυλάκου.

Αιμάτωμα εγκεφαλικό υποκάψιο

Χειρουργική παροχέτευση.

Αιμόπτυση

Αντιβηχικά (βλέπε Βρογχίτις), ηρεμιστικά (βλέπε Άγχος), ορμόνη οπισθίου λοιού υποφύσεως (10 διεθνείς μονάδες ενδοφλεβίως). Εμβολισμός αιμορραγούσης αρτηρίας (προσοχή να μην εμβολισθεί η προσθία νωτιαία αρτηρία).