

ΗΠΑΤΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Συνδυαστικά σχήματα

GEMOX

Γκεμισπαμπίνη: 1.000 mg/m² ενδοφλεβίως
την ημέρα 1

Οξαλιπλατίνη: 100 mg/m² την ημέρα 2

Επανάληψη κύκλου κάθε 2 εβδομάδες [262].

FOLFOX4

Οξαλιπλατίνη: 85 mg/m² ενδοφλεβίως
την ημέρα 1

5-φθοριοουρακίλη: 400 mg/m² ενδοφλεβίως
εφάπαξ εν συνεχεία 600 mg/
m² ενδοφλεβίως με συνεχή
έγχυση για 22 ώρες τις
ημέρες 1 και 2

Λευκοβορίνη: 200 mg/m² ενδοφλεβίως τις
ημέρες 1 και 2 χορηγείται σε
2ωρη έγχυση πριν από την
5-φθοριοουρακίλη

Επανάληψη κύκλου κάθε 2 εβδομάδες [263].

Μπεβασιζουμάμπη + Ερλοτινίμπη

Μπεβασιζουμάμπη: 10 mg/kg ενδοφλεβίως τις
ημέρες 1 και 14

Ερλοτινίμπη: 150 mg από του στόματος
την ημέρα

Επανάληψη κύκλου κάθε 28 ημέρες [264].

Μονοθεραπείες

Σοραφενίμπη

Σοραφενίμπη: 400 mg από του στόματος,
2 φορές την ημέρα

*Συνέχιση θεραπείας μέχρι την εξέλιξη της νόσου [265].
Η δόση μπορεί να μειωθεί σε επίπεδα 400 mg εφάπαξ την
ημέρα ή 400 mg κάθε 2 ημέρες.*

Δοξορουβικίνη

Δοξορουβικίνη: 20-30 mg/m² ενδοφλεβίως
την εβδομάδα

Επανάληψη κύκλου κάθε εβδομάδα [266].

Σισπλατίνη

Σισπλατίνη: 80 mg/m² ενδοφλεβίως
την ημέρα 1

Επανάληψη κύκλου κάθε εβδομάδα [267].

Καπεσιταμπίνη

Καπεσιταμπίνη: 1.000 mg/m² από του
στόματος, 2 φορές την ημέρα
τις ημέρες 1-14

*Επανάληψη κύκλου κάθε 21 ημέρες [268]. Η δόση μπορεί
να μειωθεί σε επίπεδα 850-900 mg/m² από του στόματος,
δύο φορές ημερησίως, τις ημέρες 1-14. Η μείωση της δόσης
μπορεί να ελαττώσει τον κίνδυνο τοξικότητας χωρίς να περι-
οριστεί η κλινική αποτελεσματικότητα της θεραπείας.*

Μπεβασιζουμάμπη

Μπεβασιζουμάμπη: 10 mg/kg ενδοφλεβίως
την ημέρα 1

Επανάληψη κύκλου κάθε 14 ημέρες [269].

ΘΥΜΩΜΑ

CAP

Κυκλοφωσφαμίδη:	500 mg/m ² ενδοφλεβίως την ημέρα 1
Δοξορουβικίνη:	50 mg/m ² ενδοφλεβίως την ημέρα 1
Σισπλατίνη:	50 mg/m ² ενδοφλεβίως την ημέρα 1

Επανάληψη κύκλου κάθε 21 ημέρες [594].

Σισπλατίνη + Ετοποσίδη

Σισπλατίνη:	60 mg/m ² ενδοφλεβίως την ημέρα 1
Ετοποσίδη:	120 mg/m ² ενδοφλεβίως τις ημέρες 1–3

Επανάληψη κύκλου κάθε 21 ημέρες [595].

ADOC

Σισπλατίνη:	50 mg/m ² ενδοφλεβίως την ημέρα 1
Δοξορουβικίνη:	40 mg/m ² ενδοφλεβίως την ημέρα 1
Βινκριστίνη:	0.6 mg/m ² ενδοφλεβίως την ημέρα 3
Κυκλοφωσφαμίδη:	700 mg/m ² ενδοφλεβίως την ημέρα 4

Επανάληψη κύκλου κάθε 28 ημέρες [596].

VIP

Ετοποσίδη (VP-16):	75 mg/m ² ενδοφλεβίως τις ημέρες 1-4
Ιφωσαμίδη:	1.200 mg/m ² ενδοφλεβίως τις ημέρες 1-4
Σισπλατίνη:	20 mg/m ² ενδοφλεβίως τις ημέρες 1-4
Μέσωνα:	240 mg/m ² ενδοφλεβίως πριν την πρώτη δόση ιφωσαμίδης ακολούθως σε 4 και 8 ώρες τις ημέρες 1-4

Επανάληψη κύκλου κάθε 21 ημέρες για συνολικά 4 κύκλους [597]. Να χορηγείται αυξητικός παράγοντας ουδετεροφίλων υποστηρικτικά σε δόση 5 μg/kg/ημέρα τις ημέρες 5-15.

Γκεμισιταμπίνη + Τοποτεκάνη

Γκεμισιταμπίνη:	1.000 mg/m ² ενδοφλεβίως τις ημέρες 1, 8 και 15
Τοποτεκάνη:	0,75-1,5 mg/m ² ενδοφλεβίως τις ημέρες 1, 8 και 15

Επανάληψη κύκλου κάθε 21 ημέρες [598].

Καρμποπλατίνη + Πακλιταξέλη

Καρμποπλατίνη:	στόχος AUC= 6 ενδοφλεβίως την ημέρα 1
Πακλιταξέλη:	225 mg/m ² ενδοφλεβίως την ημέρα 1

Επανάληψη κύκλου κάθε 21 ημέρες [599].

ΚΑΚΟΗΘΕΣ ΜΕΛΑΝΩΜΑ

Επικουρική θεραπεία

Ιντερφερόνη α -2b

Ιντερφερόνη α -2b: 20 εκατομμύρια μονάδες/ m^2
ενδοφλεβίως 5 φορές την
εβδομάδα για 4 εβδομάδες
και ακολούθως 10
εκατομμύρια μονάδες/ m^2
υποδορίως 3 φορές την
εβδομάδα για 48 εβδομάδες

Η θεραπεία διαρκεί συνολικά 1 έτος [443].

Μεταστατική νόσος

Συνδυαστικές θεραπείες

DTIC + BCNU + Σισπλατίνη

Δακαρβαζίνη: 220 mg/ m^2 ενδοφλεβίως
τις ημέρες 1-3
Καρμουστίνη: 150 mg/ m^2 ενδοφλεβίως
την ημέρα 1
Σισπλατίνη: 25 mg/ m^2 ενδοφλεβίως
τις ημέρες 1-3

Επανάληψη κύκλου με δακαρβαζίνη και σισπλατίνη κάθε 21
ημέρες και καρμουστίνη κάθε 42 ημέρες [444].

IFN + DTIC

Ιντερφερόνη α -2b: 15 εκατομμύρια μονάδες/ m^2
ενδοφλεβίως τις ημέρες
1-5, 8-12 και 15-19 ως
θεραπεία έναρξης