

# Διαφορική διάγνωση οφθαλμικών συμπτωμάτων

## ΑΙΣΘΗΜΑ ΚΑΥΣΟΥ

**Πιο συχνά.** Βλεφαρίτιδα, μεϊβομιανίτιδα, σύνδρομο έξρου οφθαλμού, επιπεφυκίτιδα (λοιμώδης, αλλεργική, μηχανική, χημική).

**Λιγότερο συχνά.** Ελλείμματα επιθηλίου κερατοειδούς (συνήθως επισημαινόμενα μέσω της χρώσης του κερατοειδούς με φλουνορεσκεΐνη), φλεγμαίνον πτερύγιο ή στεάτιο, επισκληρίτιδα, κερατοεπιπεφυκίτιδα του άνω σκληροκερατοειδικού ορίου, οφθαλμική τοξικότητα (φάρμακα, καλλυντικά, διαλύματα φακών επαφής), προβλήματα που σχετίζονται με φακούς επαφής.

## ΣΤΡΑΒΙΣΜΟΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ

Βλέπε 8.4, Εσωτροπίες σε παιδιά (στροφή των οφθαλμών προς τα έσω) ή 8.5, Εξωτροπίες σε παιδιά (στροφή των οφθαλμών προς τα έξω).

## ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΟΡΑΣΗ

**1. Παροδική απώλεια όρασης** (η όραση επανέρχεται στο φυσιολογικό εντός 24 ωρών, συνήθως σε 1 ώρα).

**Πιο συχνά.** Λίγα δευτερόλεπτα (συνήθως αμφοτέροπλευρα): Οίδημα οπτικού δίσκου. Λίγα λεπτά: Παροδική αμάρωση (παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο, ετερόπλευρη), ανεπάρκεια σπονδυλοβασικής αρτηρίας (αμφοτέροπλευρη). Δέκα έως 60 λεπτά: Ημικρανία (με ή χωρίς επακόλουθη κεφαλαλγία).

**Λιγότερο συχνά.** Επικείμενη απόφραξη της κεντρικής φλέβας του αμφιβληστροειδούς, ισχαιμική οπτική νευροπάθεια, οφθαλμικό ισχαιμικό σύνδρομο (αποφρακτική νόσος της καρωτίδας), γλαύκωμα, αιφνίδια μεταβολή της αρτηριακής πίεσης, βλάβη του κεντρικού νευρικού συστήματος (ΚΝΣ), drusein οπτικού δίσκου, γιγαντοκυτταρική αρτηρίτιδα, βλάβη του κόγχου (η απώλεια της

όρασης μπορεί να σχετίζεται με τις κινήσεις του οφθαλμού).

### 2. Απώλεια όρασης που διαρκεί >24 ώρες

- **Αιφνίδια, ανώδυνη απώλεια**

**Πιο συχνά.** Απόφραξη αρτηρίας ή φλέβας του αμφιβληστροειδούς, ισχαιμική οπτική νευροπάθεια, αιμορραγία υαλοειδούς, αποκόλληση αμφιβληστροειδούς, οπτική νευρίτιδα (άλγος κατά τις οφθαλμικές κινήσεις σε >50% των περιπτώσεων), αιφνίδια ανακάλυψη προϋπάρχουσας ετερόπλευρης απώλειας όρασης.

**Λιγότερο συχνά.** Άλλα νοσήματα του αμφιβληστροειδούς ή του ΚΝΣ (π.χ. αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο), δηλητηρίαση από μεθανόλη, απόφραξη της οφθαλμικής αρτηρίας (μπορεί να υπάρχουν, επίσης, διαταραχές της οφθαλμοκινητικότητας και πτώση άνω βλεφάρου).

- **Προοδευτική, ανώδυνη απώλεια (διάρκειας εβδομάδων, μηνών ή ετών)**

**Πιο συχνά.** Καταρράκτης, διαθλαστική ανωμαλία, γλαύκωμα ανοικτής γωνίας, χρόνιο γλαύκωμα κλειστής γωνίας, χρόνια νόσος του αμφιβληστροειδούς [π.χ. ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας (ΗΕΩ), διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια].

**Λιγότερο συχνά.** Χρόνια νόσος του κερατοειδούς (π.χ. δυστροφία κερατοειδούς), οπτική νευροπάθεια/απροφία (π.χ. όγκος του ΚΝΣ).

- **Επώδυνη απώλεια:** Οξύ γλαύκωμα κλειστής γωνίας, οπτική νευρίτιδα (μπορεί να υπάρχει άλγος κατά τις οφθαλμικές κινήσεις), ραγοειδιτίδα, ενδοφθαλμίτιδα, ύδρωπας κερατοειδούς (κερατόκωνος).

### 3. Μετατραυματική απώλεια όρασης:

Οίδημα βλεφάρων, ανωμαλία κερατοειδούς, ύφαιμα, ρήγη βολβού, τραυματικός καταρράκτης, παρεκτόπιση φακού, διάσειση αμφιβληστροειδούς, αποκόλληση αμφιβληστροειδούς, αιμορραγία αμφιβληστροειδούς ή υαλοειδούς, τραυματική οπτική νευροπάθεια, νευροπάθειες κρανιακών νευρών, τραύμα του ΚΝΣ.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Πάντα να θυμάστε τη μη οργανική απώλεια όρασης

## ΕΚΚΡΙΣΕΙΣ

Βλέπε «Ερυθρός οφθαλμός» σε αυτό το κεφάλαιο.

## ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΟΡΑΣΗΣ

**Πιο συχνά.** Διαθλαστική ανωμαλία [συμπεριλαμβάνονται η πρεσβυωπία, η επίκτητη μωραπία (π.χ. από καταρράκτη, σακχαρώδη διαβήτη, σπασμό του ακτινωτού σώματος, φάρμακα, χειρουργική επέμβαση αποκόλλησης αμφιβληστροειδούς], και ο επίκτητος αστιγματισμός (π.χ. από χειρουργική επέμβαση του πρόσθιου ημιμορίου, χαλάζιο, κατάγμα του κόγχου και οίδημα], νόσος της ωχράς κηλίδας [π.χ. κεντρική ορώδης χοριοαμφιβληστροειδοπάθεια, οίδημα ωχράς, ΗΕΩ και άλλες νόσοι που σχετίζονται με χοριοειδικές νεοαγγειακές μεμβράνες (XNM)], ανωμαλία του κερατοειδούς, δηλητηρίαση (π.χ. με αιθανόλη, μεθανόλη), φαρμακολογική (π.χ. επίθεμα σκοπολαμίνης).

**Λιγότερο συχνά.** Κερατόκωνος, τοπικές οφθαλμικές σταγόνες (π.χ. μυωτικά, κυκλοπληγικά), αποκόλληση αμφιβληστροειδούς, ημικρανία (παροδικά), υποτονία, ανωμαλίες του ΚΝΣ (συμπεριλαμβανομένου του οιδήματος των οπτικών θηλών), μη οργανική.

## ΔΙΠΛΩΠΙΑ

1. **Μονόφθαλμη** (η διπλωπία παραμένει όταν καλυφθεί ο μη προσβεβλημένος οφθαλμός)

**Πιο συχνά.** Διαθλαστική ανωμαλία, λανθασμένη ευθυγράμμιση των γυαλιών, θολερότητα ή ανωμαλία του κερατοειδούς (συμπεριλαμβανομένης της χειρουργικής του κερατοειδούς και της διαθλαστικής χειρουργικής), καταρράκτης, ελλείμματα της ίριδας (μη οργανική, σε ιριδεκτομή).

**Λιγότερο συχνά.** Παρεκτόπιση του φυσικού φακού ή του τεχνητού ενδοφακού, νόσος της ωχράς κηλίδας, αποκόλληση αμφιβληστροειδούς, αιτία από το ΚΝΣ (σπάνια), μη οργανική.

2. **Διόφθαλμη** (η διπλωπία εξαλείφεται όταν καλυφθεί ο ένας οφθαλμός)

- **Τυπικά διαλείπουσα:** Μυασθένεια gravis, διαλείπουσα ανεπάρκεια της αντιρρόησης μιας προϋπάρχουσας φορίας.

– **Σταθερή:** Μεμονωμένη παράλυση έκτου, τρίτου ή τέταρτου κρανιακού νεύρου, νόσος του κόγχου [π.χ. θυρεοειδική οφθαλμοπάθεια, ιδιοπαθής φλεγμονή του κόγχου (ψευδόγκος του κόγχου), όγκος], σύνδρομο σηραγγώδους κόλπου/υπερκόγχιου σχίσματος, μετά από χειρουργική του οφθαλμού (π.χ. υπολειμματική αναισθησία, παρεκτοπισμένος μυς, υποδιόρθωση ή υπερδιόρθωση μετά από χειρουργική των μυών, περιορισμός από μόσχευμα σκληρικής πρώσης βαριά ανισοεικονία μετά από διαθλαστική χειρουργική], μετά από τραύμα (π.χ. κάταγμα τοιχώματος του κόγχου με εγκλωβισμό εξοφθάλμου μυός, οίδημα του κόγχου), διαπυρηνική οφθαλμοπληγία, ανεπάρκεια σπονδυλοβασικής αρτηρίας, άλλες βλάβες του ΚΝΣ, προβλήματα των γυαλιών.

## ΞΗΡΟΙ ΟΦΘΑΛΜΟΙ

Βλέπε 4.3, Σύνδρομο ξηρού οφθαλμού.

## ΑΠΩΛΕΙΑ ΒΛΕΦΑΡΙΔΩΝ

Τραύμα, έγκαυμα, θυρεοειδοπάθεια, σύνδρομο Vogt – Koyanagi – Harada, λοιμώξη ή φλεγμονή του βλεφάρου, ακτινοβολία, χρόνια δερματοπάθεια (π.χ. γυροειδής αλωπεκία), νεόπλασμα του δέρματος, τριχοτίλομανία.

## ΕΦΕΛΚΙΔΕΣ ΤΩΝ ΒΛΕΦΑΡΩΝ

**Πιο συχνά.** Βλεφαρίτιδα, μεϊβομιανίτιδα, επιπεφυκίτιδα.

**Λιγότερο συχνά.** Σωληναρίτιδα, απόφραξη ρινοδακρυϊκού πόρου, δακρυοκυστίτιδα.

## ΒΛΕΦΑΡΟΠΤΩΣΗ

Βλέπε 6.1, Πτώση άνω βλεφάρου.

## ΟΙΔΗΜΑ ΒΛΕΦΑΡΟΥ

1. **Σε συνδυασμό με φλεγμονή** (συνήθως ερυθματώδη).

**Πιο συχνά.** Κριθή, βλεφαρίτιδα, επιπεφυκίτιδα, προδιαφραγματική κυτταρίτιδα ή κυτταρίτιδα κόγχου, τραύμα, δερματίτιδα εξ επαφής, δερματίτιδα από απλό έρπητα ή έρπητα ζωστήρα.

**Λιγότερο συχνά.** Εκτρόπιο, ανωμαλία κερατοειδούς, ουρτικάρια ή αγγειοοίδημα, βλεφαροχά-

λαση, δήγμα εντόμου, δακρυοαδενίτιδα, ερυσίπελας, μάζα του βλεφάρου ή του δακρυϊκού αδένα, αυτοάνοσα νοσήματα (π.χ. δισκοειδής λύκος, δερματομυοσίτιδα).

**2. Μη φλεγμονώδες:** Χαλάζιο, δερματοχάλαση, πρόπτωση κογχικού λίπους (η ώθηση του βολβού προς τα πίσω αυξάνει την πρόπτωση), χαλαρότητα του δέρματος του βλεφάρου, καρδιοπάθεια, νεφροπάθεια ή θυρεοειδοπάθεια, σύνδρομο άνω κοιλής φλέβας, μάζα του βλεφάρου ή του δακρυϊκού αδένα, ξένο σώμα.

## ΣΠΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΒΛΕΦΑΡΟΥ

Οφθαλμική μυοκυμία (σχετιζόμενη με κόπωση, υπερβολική λήψη καφεΐνης, φάρμακα ή στρες), ερεθισμός του κερατοειδούς ή του επιπεφυκότα (ιδίως από βλεφαρίδα, κύστη ή ξένο σώμα επιπεφυκότα), ξηρός οφθαλμός, βλεφαρόσπασμος (αμφοτερόπλευρος), σπασμός ημιπροσώπου, αλφισμός (φωτειναισθησία), ανωμαλία των ηλεκτρολυτών του ορού, σύνδρομο Tourette, επώδυνο τικ, αναιμία (σπάνια).

## ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΣΥΓΚΛΕΙΣΗΣ ΤΩΝ ΒΛΕΦΑΡΩΝ (ΛΑΓΟΦΘΑΛΜΟΣ)

Βαριά πρόπτωση βολβού, βαριά χύμωση, ουλοποίηση των βλεφάρων, ουλοποίηση του έλκοντος το βλέφαρο μυός, παράλυση έβδομου κρανιακού νεύρου, μετά από αισθητική ή επανορθωτική χειρουργική επέμβαση του προσώπου.

## ΟΦΘΑΛΜΟΙ ΠΟΥ «ΠΡΟΒΑΛΛΟΥΝ» (ΠΡΟΠΤΩΣΗ)

Βλέπε 7.1, Νοσήματα του κόγχου.

## ΟΦΘΑΛΜΟΙ ΠΟΥ «ΑΝΑΠΗΔΟΥΝ» (ΤΑΛΑΝΤΟΨΙΑ)

Επίκτητος νυσταγμός, διαπυρηνική οφθαλμοπληγία, μιασθένεια gravis, απώλεια της αιθουσαίας λειτουργίας, οφόκλονος/οφθαλμικός πτερυγισμός, μυοκυμία του άνω λοξού, διάφορες διαταραχές του ΚΝΣ.

## ΦΩΤΑΨΙΕΣ

**Πιο συχνά:** Ρωγμή ή αποκόλληση αμφιβληστροειδούς, οπίσθια αποκόλληση υαλοειδούς, ημικρανία, ταχείες οφθαλμικές κινήσεις (ιδίως στο σκοτάδι), οφθαλμοδακτυλικός ερεθισμός.

**Λιγότερο συχνά:** Διαταραχές του ΚΝΣ (ιδίως του ινιακού λοβού), ανεπάρκεια σπονδυλοιοβασικής αρτηρίας, οπτικές νευροπάθειες, αμφιβληστροειδίτιδα, ενδοπτικά φαινόμενα, ψευδαισθήσεις.

## ΜΥΙΟΨΙΕΣ

Βλέπε «Στίγματα μπροστά από τους οφθαλμούς» σε αυτό το κεφάλαιο.

## ΑΙΣΘΗΜΑ ΞΕΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Σύνδρομο ξηρού οφθαλμού, βλεφαρίτιδα, επιπεφυκίτιδα, τριχίαση, ανωμαλία του κερατοειδούς (π.χ. εκδορά ή ξένο σώμα κερατοειδούς, υποτροπιάζουσα απόπτωση, επιπολής στικτή κερατοειδοπάθεια), πρόβλημα που σχετίζεται με φακούς επαφής, επισκληρίτιδα, πτερύγιο, στεάτιο.

## ΘΑΜΒΟΣ

Καταρράκτης, ψευδοφακία, θόλωση του οπίσθιου περιφακίου, ανωμαλία ή θολερότητα του κερατοειδούς, διαταραχή της δομής ή της αντίδρασης της κόρης, μετά από διαθλαστική χειρουργική, οπίσθια αποκόλληση υαλοειδούς, φαρμακευτικό (π.χ. με ατροπίνη).

## ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΣΕΙΣ (ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ)

Οπίσθια αποκόλληση υαλοειδούς (λευκές αστραποειδείς γραμμές του Moore), αποκόλληση αμφιβληστροειδούς, οπτικές νευροπάθειες, τυφλοί οφθαλμοί, αμφοτερόπλευρη επίδεση των οφθαλμών, σύνδρομο Charles – Bonnet, ψύχωση, βλάβες της βρεγματοκροταφικής περιοχής, άλλα αίτια του ΚΝΣ, φάρμακα.

## ΑΛΩΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΑ ΦΩΤΑ

Καταρράκτης, ψευδοφακία, θόλωση του οπίσθιου περιφακίου, οξύ γλαύκωμα κλειστής γωνίας ή οιδήμα κερατοειδούς άλλης αιτίας (π.χ. αφακική ή ψευδοφακική φυσαλιδώδης κερατοειδοπάθεια, υπέρμετρη χρήση φακών επαφής), δυστροφίες κερατοειδούς, μετά από διαθλαστική χειρουργική, θόλωση του κερατοειδούς, εκκρίσεις, σύνδρομο διασποράς χρωστικής, θολερότητες του υαλοειδούς, φάρμακα (π.χ. δακτυλίτιδα, χλωροκίνη).

## ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ

Βλέπε 10.26, Κεφαλαλγία.

## 1

**ΚΝΗΣΜΩΔΕΙΣ ΟΦΘΑΛΜΟΙ**

Επιπεφυκίτιδα (ιδίως αλλεργική, εαρινή και ιογενής), βλεφαρίτιδα, σύνδρομο ξηρού οφθαλμού, αλλεργία ή δερματίτιδα εξ επαφής από τοπική χρήση φαρμάκων, επιπεφυκίτιδα γιγαντιαίων θηλών ή άλλα προβλήματα που σχετίζονται με φακούς επαφής.

**ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΤΟ ΦΩΣ  
(ΦΩΤΟΦΟΒΙΑ)****1. Με παθολογικά ευρήματα στην οφθαλμολογική εξέταση**

**Πιο συχνά:** Ανωμαλία κερατοειδούς (π.χ. εκδορά ή οιδημα), πρόσθια ραγοειδίτιδα.

**Λιγότερο συχνά:** Επιπεφυκίτιδα (ήπια φωτοφοβία), οπίσθια ραγοειδίτιδα, σκληρίτιδα, αλφισμός, ολική αχρωματοψία, ανιριδία, μυδρίαση οποιασδήποτε αιτιολογίας (π.χ. φαρμακευτική, τραυματική), συγγενές γλαύκωμα.

**2. Με φυσιολογική οφθαλμολογική εξέταση:**

Ημικρανία, μηνιγγίτιδα, οπισθιοβολβική οπτική νευρίτιδα, υπαραχνοειδής αιμορραγία, νευραλγία τριδύμου ή οφθαλμός με μικρού βαθμού μελάγχρωση.

**ΝΥΚΤΑΛΩΠΙΑ**

**Πιο συχνά:** Διαθλαστική ανωμαλία (ιδίως υποδιορθωμένη μυωπία), προχωρημένο γλαύκωμα ή ατροφία οπτικού δίσκου, μικρή κόρη (ιδίως από μυωτικές σταγόνες), μελαγχρωστική αμφιβλητοειδοπάθεια, συγγενής μη προοδευτική νυκταλωπία, μετά από παναμφιβληστροειδική φωτοπεξία, φάρμακα (π.χ. φαινοθειαζίνες, χλωροκίνη, κινίνη).

**Λιγότερο συχνά:** Ανεπάρκεια βιταμίνης A, γυροειδής ατροφία, χοριοειδερημία.

**ΑΛΓΟΣ****1. Οφθαλμικό**

– **Τυπικά ήπιο έως μέτριο:** Σύνδρομο ξηρού οφθαλμού, βλεφαρίτιδα, λοιμώδης επιπεφυκίτιδα, επισκληρίτιδα, φλεγμαίνοντα στεάτιο ή πτερύγιο, ξένο σώμα (κερατοειδούς ή επιπεφυκότα), διαταραχή του κερατοειδούς (π.χ. επιπολής στικτή κερατοειδοπάθεια), κερατοεπιπεφυκίτιδα του άνω σκληροκερατοειδικού ορίου, τοξικότητα από οφθαλμικά

φάρμακα, προβλήματα που σχετίζονται με φακούς επαφής, μετεγχειρητικά, οφθαλμικό ισχαιμικό σύνδρομο, οφθαλμική κόπωση από μη διορθωμένη διαθλαστική ανωμαλία.

- **Τυπικά μέτριο έως έντονο:** Διαταραχή του κερατοειδούς (π.χ. εκδορά, απόπτωση, διήθηση/έλκος/κερατίτιδα, χημικό τραύμα, έγκαυμα από υπεριώδη ακτινοβολία), τραύμα, πρόσθια ραγοειδίτιδα, σκληρίτιδα, ενδοφθαλμίτιδα, οξύ γλαύκωμα κλειστής γωνίας.
- 2. **Περικογχικό:** Τραύμα, κριθή, προδιαφραγματική κυτταρίτιδα, δακρυοκυστίτιδα, δερματίτιδα (π.χ. εξ επαφής, χημική, από ίο έρπητα ζωστήρα ή απλού έρπητα), αντανακλαστικό άλγος (π.χ. από δόντια ή παραρρίνιο κόλπο), επώδυνο τικ.
- 3. **Κογχικό:** Παραρρινοκολπίτιδα, τραύμα, κυτταρίτιδα κόγχου, σύνδρομο ιδιοπαθούς φλεγμονής του κόγχου, όγκος ή μάζα του κόγχου, οπτική νευρίτιδα, οξεία δακρυοαδενίτιδα, ημικρανία ή αθροιστική κεφαλαλγία, διαβητική παράλυση κρανιακού νεύρου.
- 4. **Ασθενωπία:** Μη διορθωμένη διαθλαστική ανωμαλία, φορία ή τροπία, ανεπάρκεια σύγκλισης, σπασμός προσαρμογής, φαρμακευτική (μυωτικά).

**ΕΡΥΘΡΟΣ ΟΦΘΑΛΜΟΣ**

- 1. **Άιτια που προέρχονται από τα εξαρτήματα:** Τριχίαση, διστιχίαση, σύνδρομο χαλαρού βλεφάρου, εντρόπιο ή εκτρόπιο, λαγόφθαλμος (ατελής σύγκλειση των βλεφάρων), βλεφαρίτιδα, μείζωμα ιανίτιδα, ροδόχρους ακμή, δακρυοκυστίτιδα, σωληναρίτιδα.
- 2. **Άιτια που προέρχονται από τον επιπεφυκότα:** Νεογνική οφθαλμία σε βρέφη, επιπεφυκίτιδα (βακτηριακή, ιογενής, χημική, αλλεργική, αποπική, εαρινή, τοξικότητα φαρμάκων), υπόσφαγμα, φλεγμαίνοντα στεάτιο, κερατοεπιπεφυκίτιδα του άνω σκληροκερατοειδικού ορίου, επιπεφυκίτιδα γιγαντιαίων θηλών, ξένο σώμα επιπεφυκότα, συμβλέφαρο και σχετικές αιτίες (π.χ. οφθαλμικό ουλώδες πεμφιγοειδές, σύνδρομο Stevens – Johnson, τοξική επιδερμιδική νεκρόλυση), νεοπλασία επιπεφυκότα.
- 3. **Άιτια που προέρχονται από τον κερατοειδή:** Λοιμώδης ή φλεγμονώδης κερατίτιδα, προβλήματα που σχετίζονται με φακούς επαφής (βλέ-

πε 4.21, Προβλήματα που σχετίζονται με φακούς επαφής), ξένο σώμα κερατοειδούς, υποτροπιάζουσα απόπτωση επιθηλίου κερατοειδούς, πτερύγιο, νευροτροφική κερατοειδοπάθεια, μετά από χρήση φαρμάκων, έγκαυμα από υπεριώδη ακτινοβολία, χημικό έγκαυμα.

- 4. Άλλα:** Τραύμα, μετεγχειρητικά, σύνδρομο ξηρού οφθαλμού, ενδοφθαλμίτιδα, πρόσθια ραγοειδίτιδα, επισκληρίτιδα, σκληρίτιδα, φαρμακευτική (π.χ. ανάλογα προσταγλανδινών), γλαύκωμα κλειστής γωνίας, καρωτιδοσηραγγώδες συρίγγιο (επιπεφυκοτικά αγγεία δίκην τιρμπουσόν), αθροιστική κεφαλαλγία.

## «ΣΤΙΓΜΑΤΑ» ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΦΘΑΛΜΟΥΣ

### 1. Παροδικά: Ημικρανία.

### 2. Μόνιμα ή μακροχρόνια

**Πιο συχνά:** Οπίσθια αποκόλληση υαλοειδούς, διάμεση ή οπίσθια ραγοειδίτιδα, αιμορραγία υαλοειδούς, συμπυκνώσεις/συντρίμματα υαλοειδούς.

**Λιγότερο συχνά:** Μικρούφαιμα, ύφαιμα, ρωγμή ή αποκόλληση αμφιβληστροειδούς, θολερότητα ή ξένο σώμα κερατοειδούς.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Μερικοί ασθενείς αναφέρονται σε ένα τυφλό σημείο στο οπικό τους πεδίο που προκαλείται από διαταραχή του αμφιβληστροειδούς του οπικού νεύρου ή του ΚΝΣ.

## ΔΑΚΡΥΡΡΟΙΑ

### 1. Ενήλικοι

– **Παρουσία άλγους:** Ανωμαλία κερατοειδούς (π.χ. εκδορά, ξένο σώμα ή δακτύλιος σκουριάς, υποτροπιάζουσα απόπτωση, οίδημα), πρόσθια ραγοειδίτιδα, διαταραχή των βλεφαρίδων ή των βλεφάρων (π.χ. τριχίση, εντρόπιο), ξένο σώμα επιπεφυκότα, δακρυοκυστίτιδα, δακρυοσαδενίτιδα, σωληναρίτιδα, τραύμα.

– **Ελάχιστο/καθόλου άλγος:** Σύνδρομο ξηρού οφθαλμού, βλεφαρίτιδα, απόφραξη ρινοδακρυϊκού πόρου, απόφραξη δακρυϊκού σημείου, μάζα δακρυϊκού ασκού, εκτρόπιο, επιπεφυκίτιδα (ιδιως αλλεργική και τοξική), συναισθηματικές καταστάσεις, κροκοδείλια δάκρυα (συγγενής ή παράλυση εβδόμου κρανιακού νεύρου).

2. **Παιδιά:** Απόφραξη ρινοδακρυϊκού πόρου, συγγενές γλαύκωμα, ξένο σώμα κερατοειδούς ή επιπεφυκότα ή άλλες ερεθιστικές διαταραχές.